

## 意見書

kidsroomなないろ 苑

氏名 \_\_\_\_\_

病名 「 \_\_\_\_\_ 」

上記症状において主要症状が消退した為、集団生活に支障がない状態まで回復したものと判断し、

年 月 日 より、登園可能である事を認めます。

年 月 日

医療機関名 \_\_\_\_\_

医師名 \_\_\_\_\_

(印)

\* 乳幼児が集団で生活しております。感染症の集団発生や流行、蔓延を出来るだけ防ぎ  
こどもたちが快適に生活できるよう、下記の感染症について診断の上、意見書の提出を お願い致します。

\* 感染力のある期間に留意し、感染力が消滅し、集団生活が無理なく行える回復状態となったからの登園となるよう  
ご配慮の程、よろしくお願い致します。

### ★お医者様の「意見書」が必要な感染症

感染症名	主な症状	感染期間	登園の目安
水痘（水ぼうそう）	小さく赤い斑点→水泡のある発疹	発疹出現1～2日前から 出た後の6～7日間	すべての発疹が、かさぶたになってから
風疹（三日はしか）	発熱・発疹・耳の後ろ、首・脇の下の腫れ・咳・結膜の充血など	発疹出現7日前から 出た後の7日間	発疹が消失してから
麻疹（はしか）	発熱・咳・鼻水・目やに、頬の内側に白い斑点。発熱の4日目頃より発疹	発熱～発疹までが最も強い。発疹出現4日後迄	解熱後、3日経過してから
インフルエンザ	高熱・頭痛・関節痛・全身倦怠感	症状が出る1日前から 発病後3～4日間	抗インフルエンザ薬を服用していない事 解熱後、3日経過してから
流行性耳下腺炎（おたふく風邪）	発熱・食欲不振。片側または両側のあごの後ろ（耳の下）の腫れと痛み	症状が出る3日前から 耳下が腫れた4日後迄	あごの後ろ（耳下腺）の腫れが引いてから
百日咳	喉の赤み、強くヒューヒューした特有の咳が続く（特に夜～明け方）	咳がはじめてから 3～4週間	抗菌薬を7日間服用し、特有の咳が消失し 体力・食欲が戻ってから
咽頭結膜熱（プール熱）	高熱・結膜炎・リンパ節の腫れ・咽頭痛	発熱や結膜炎発症から 4日～7日間	主な症状が消失し、2日経過してから
結核	初期症状なし。微熱・倦怠感・咳 食欲不振・体重の減少	約4週間～半年	医師より、感染の恐れなしと認められてから
腸管出血性大腸菌感染症（O-157など）	激しい腹痛・下痢（水様便）・血便	発症してから4～7日間	医師より、感染の恐れなしと認められてから
流行性角結膜炎	目の充血・目やに・まぶたの腫れ	発症後2～4日間	主要症状が消失してから